

带状疱疹の予防接種について（令和7年度）

1 带状疱疹とは

带状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した 水痘带状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「带状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

带状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

2 带状疱疹ワクチンとは

带状疱疹ワクチンには生ワクチン（阪大微研：乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」）、組換えワクチン（GSK 社：シングリックス）の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、带状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

その他に、接種前に発熱を呈している方、重篤な急性疾患に罹っている方、それぞれの予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方等はいずれのワクチンをも接種出来ません。

また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、带状疱疹ワクチン（生ワクチン、組換えワクチン）の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。

3 対象となる方

鹿屋市に住民登録があり、自らの意思で接種を希望する方で、①②③のいずれかに該当する方

- ① 年度内に65歳を迎える方（令和7年度対象者：下記表のとおり）
- ② 接種日において60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方（身体障害者手帳1級の方）
- ③ 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳（※）となる方も対象となります。

※ 100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。

対象者	生年月日	対象者	生年月日
65歳	S35.4.2生～S36.4.1生	85歳	S15.4.2生～S16.4.1生
70歳	S30.4.2生～S31.4.1生	90歳	S10.4.2生～S11.4.1生
75歳	S25.4.2生～S26.4.1生	95歳	S5.4.2生～S6.4.1生
80歳	S20.4.2生～S21.4.1生	100歳	T14.4.2生～T15.4.1生

4 带状疱疹ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

5 定期接種を受ける方法・費用など

		生ワクチン（阪大微研）	組換えワクチン（GSK 社）
接 種 回 数		1 回	2 回
接 種 方 法		皮下接種	筋肉内接種
接種スケジュール		—	通常、2 か月以上の間隔を置いて 2 回接種 ※①
標準的な接種費用 （厚労省見込）		8,860 円	1 回あたり 22,060 円
助成金額（鹿屋市）		4,000 円	1 回あたり 10,000 円
予 防 効 果	接種後 1 年時点	6 割程度	9 割程度
	接種後 5 年時点	4 割程度	9 割程度
	接種後 10 年時点	—	7 割程度
主な副反応の発現割合 ※ワクチンを接種した 部位の症状（厚労省）		(30%以上)発赤※ (10%以上)そう痒感※、熱感※、 腫脹※、疼痛※、硬結※ (1 %以上)発疹、倦怠感	(70%以上)疼痛※ (30%以上)発赤※、筋肉痛、疲労 (10%以上)頭痛、腫脹※、悪寒、 発熱、胃腸症状 (1 %以上)そう痒感※、倦怠感、 その他の疼痛
接種できない方		病気や治療によって、免疫が低下 している方は接種できません。	免疫の状態に関わらず接種可能で す。
接種に注意が必要な方		輸血やガンマグロブリンの注射を 受けた方は治療後 3 か月以上、大 量ガンマグロブリン療法を受けた 方は治療後 6 か月以上置いて接種 してください。	筋肉内に接種をするため、血小板 減少症や凝固障害を有する方、抗 凝固療法を実施されている方は注 意が必要です

※①病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を 1 か月まで短縮できます。

6 他のワクチンとの同時接種・接種間隔

いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。

ただし、生ワクチン（阪大微研）については、他の生ワクチンと 27 日以上の間隔を置いて接種してください。

7 接種を受けた後の注意点

ワクチンの接種後 30 分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。

注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。

当日の激しい運動は控えるようにしてください。

8 予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすることはできないことから、救済制度が設けられています。