

サツマイモ基腐病に新規登録された薬剤の 効果的な使用方法について

令和3年3月10日付けで、下記の薬剤がサツマイモ基腐病に対して農薬登録され、防除に使用できるようになりました。

下記の使用方法により、適期に防除して下さい。

○ アミスター20フロアブル

(1) 基腐病に対する登録内容

希釈倍数	使用液量	使用回数	使用時期	使用方法
2000倍	100～300ℓ／10a	3回以内	収穫14日 前まで	散布
32倍	1.6ℓ／10a			無人航空機 による散布

(2) 効果的な使用方法

- ① 散布時に発病株がある場合には、必ず株ごと除去してから散布する。
- ② 地際の茎に薬剤が十分かかるように散布することで、効果が安定する。
- ③ 多発してからの防除は効果が認められないため、発生初期からの防除を徹底する。
- ④ 連用は避け、既登録の銅剤との輪番で散布する。
- ⑤ 本剤は、発生確認後や台風通過後等の防除に適している。

(3) 参考資料

国のサツマイモ基腐病の発生生態と防除対策

*国（農研機構生研支援センターHP）による技術者向けマニュアル
（アドレス）

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/138589.html